



HZZO VODIČ KROZ Dodatne mogućnosti prihodovanja PREVENTIVNI PROGRAM/PANEL za djelatnost opće/obiteljske medicine

Prema podacima Zdravstveno statističkog ljetopisa za 2011. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vodeći uzrok smrtnosti u 2011. godini su bile bolesti cirkulacijskog sustava, dok su na drugom mjestu bile novotvorine i te dvije skupine su povezane s ¾ svih uzroka smrti. Prema literaturnim podacima veliki dio rizičnih čimbenika vezanih uz ove dvije skupine su preventabilni.

Također, važnost uključivanja djelatnosti opće/obiteljske medicine u provođenje preventivnih programa je neupitna zbog dostupnosti svim građanima Republike Hrvatske, te s obzirom da svaki doktor ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine skrbi o definiranoj populaciji osoba koje su opredijeljene za njegov tim.

Ciljna populacija:

- stariji od dvije godine , a mlađi od 70 godina **s izuzećem** svih osiguranika koji boluju od arterijske hipertenzije i šećerne bolesti (bolesnici sa panelom kroničnog bolesnika).

Učestalost:

- preporučuje se jedan puta godišnje, odnosno najranije nakon 6 mjeseci (mali timovi).

Obuhvat:

- 80% ciljne populacije u dvije godine.

Praćenje i valorizacija:

- **potrebno je učiniti najmanje 20 preventivnih pregleda mjesečno, odnosno najmanje 60 preventivnih pregleda unazad 3 mjeseca.**

Pojašnjenje: kako su mali timovi u sklopu pilota preventivnog programa radili preventivne preglede u značajnom opsegu, isti će se priznati kao izvršenje u novom ugovornom razdoblju.

- preventivni program se plaća u iznosu od 5% vrijednosti glavarine.

Napomena: tijekom rada u preventivnom panelu preporuča se korištenje DTP postupaka OM166, OM167, OM168 i OM169 kojima je cilj edukacija u svrhu prevencije rizičnog ponašanja.

U praksi to znači da primjerice iako netko ne puši, poželjno ga je educirati o rizicima pušenja i poduprijeti u nerizičnom ponašanju.

Izdavanje pisanih letaka je prema nahođenju ordinariusa.



Molimo pogledati tablice u nastavku:

Prevenција i smanjenje prekomjerne tjelesne težine		
svim osiguranim osobama - iznad 2. godine	tjelesna visina (TV)	Od 2.do 70.godine života
	tjelesna težina (TT)	Od 2.do 70.godine života
	Indeks tjelesne mase (ITM, kg/m ²)	Od 2.do 20.godine života - percentilne krivulje Od 20. do 70.godine - ITM
	opseg struka	odrasla populacija (stariji od 20.g.)
	opseg bokova	odrasla populacija (stariji od 20.g.)
	omjer opseg struka/opseg bokova	odrasla populacija (stariji od 20.g.)
	edukacija	Letak (nije nužan)

Rano otkrivanje oboljelih od šećerne bolesti		
stariji od 50 - godina bez obzira na BMI, ostali: BMI iznad 25 + dodatni faktori rizika	GUK	
	edukacija	Letak (nije nužan)

Prevenција pušenja		
stariji od 14 godina	pušač: da/ne	pušač da kod aktivnih i bivših pušača
	Što puši	cigarete, cigare, lula
	aktivni pušač	broj cigareta/dan
		pušački staž
	bivši pušač	broj cigareta/dan
		pušački staž
		trajanje apstinencije
	edukacija	Letak(nije nužan)



Prevenција prekomjerne konzumacije alkohola		
stariji od 14 godina	konzumira alkohol: da/ne	konzumiranje alkohola unazad godinu dana
	uzorak pijenja	prigodno, vikendom, više puta tjedno, svakodnevno
	vrsta pića	vino, pivo, žestoka pića
	procjena popijene količine	
		pojašnjenje: 1 standardno piće = 2,5 dcl piva, 1,0 dcl vina ili 0,3 dcl žestoka pića
	edukacija	prekomjerna konzumacija: muškarci više od 21 tjedno , odnosno više od 3 dnevno ; žene više od 10 tjedno odnosno više od 2 dnevno letak

Mjerenje krvnog tlaka preporučuje se osobama starijim od 18 godina.

O svim novostima obavijesti će biti poslana preko G2 sustava i/ili objavljene na CEZIH portalu.
Puno uspjeha u radu!

Vaš

